

Reinigungs- und Desinfektionsplan

	WAS	WANN	WOMIT (Mittel./ Einwirkzeit)	WIE	WER
	Hygienische Händedesinfektion	Vor Zubereitung / Verabreichung von Injektionen / Infusionen, Blutentnahmen, invasiven Maßnahmen, Kontakt mit dem Bereich der Einstichstelle von Kathetern und Drainagen, nach möglicher Kontamination mit Krankheitserregern, Kontakt mit Blut, Eiter, Stuhl, Urin, Kontakt mit Patienten, von denen Infektionen ausgehen können , nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen		Desinfektionsmittel mind. 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben, Fingerkuppen, -zwischenräume, Nagelfalze und Handrücken nicht vergessen, Hände müssen die gesamte Einwirkzeit mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.	Team
	Händepflege	
	Händewaschen	
	Hautdesinfektion	
	Chirurgische Instrumente	
	Lungenfunktionsgerät:	
	EKG/Ergometer Saugelektroden	
	Taschen für Langzeit EKG-/Blutdruck	
	Stethoskop, RR-Gerät	

	WAS	WANN	WOMIT (Mittel,/ Einwirkzeit)	WIE	WER
	Labor: Arbeitsflächen, Tablets	
	Oberflächen, z.B. Arbeitsplatz, Liegen ³ , Ergometer-Sitz und Griffe, Geräte,	
	Lagerschränke	
	Untersuchungs- liegen, Blutentnahme stuhl, Armpolster, Fußboden, Wände, Inventar sonst. Fußböden WC	
	medizinischer Abfall (z.B. Tupfer, Verbände)	
	spitze, scharfe und zerbrechliche Gegen- stände wie z. B. Kanülen, Skalpelle	